

L'esame PATCH test (test epicutaneo a lettura ritardata) si esegue previa prenotazione.

- Nei 10 giorni precedenti il test devono essere sospesi antistaminici e/o cortisonici.
- Non deve invece essere sospesa terapia inalatoria per asma e/o BPCO.

L'esame consiste nel contatto prolungato (48 ore) con una serie di sostanze (SIDAPA integrata) che maggiormente possono provocare reazioni allergiche da contatto:

- posizionamento dell'apparato testante (cerotti) sulla schiena e/o braccia
- dopo 48 ore rimozione dell'apparato testante (cerotti) da parte del medico e viene effettuata prima valutazione delle/a reattività cutanea
- Rilettura del test dopo 20-30 minuti o più (a giudizio del medico) dalla rimozione dei cerotti.

NORME PER IL PAZIENTE:

° prima dell'applicazione dei cerotti

- presentarsi per applicazione del test con cute detersa e priva di crema idratante e/o prodotti oleosi sulla schiena e sulle braccia
- se la cute della schiena è eccessivamente irsuta potrebbe essere necessario una depilazione (provvederà l'infermiera che applicherà i cerotti)

° dopo dell'applicazione dei cerotti:

- evitare di fare bagno e/o doccia per non bagnare cerotti (potrebbero staccarsi e quindi invalidare il test)
 - evitare azioni, movimenti che possano causare distacco dei cerotti
 - cercare di non sudare
 - evitare attività fisica pesante
 - non esporsi al sole
- Evitare, insomma, il distacco dei cerotti. Il distacco dei cerotti invalida il test, che quindi deve essere ripetuto con un nuovo pagamento del ticket o prezzo.
- dopo la rimozione dei cerotti non applicare profumi, creme, oli o saponi.

INFORMAZIONI UTILI:

- si può verificare una transitoria accentuazione dell'eczema
- si può accusare prurito o bruciore nella sede dei cerotti: **NON GRATTARSI!**
- In caso di prurito eccessivo e insopportabile contattare l'ambulatorio. In casi estremi può staccare i cerotti (il test viene comunque invalidato) fotografare la zona di applicazione dei test e rivolgersi al Pronto Soccorso per le cure del caso.